

Dr. med. Cornelia Raab

**Sauerstoffatmung auf Erythrocytenzahl
und Haemoglobingehalt**

1945

Aus der Klinik für innere Medizin des
Städt. Krankenhauses Offenbach a. M.
Direktor: Professor Dr. A. I. ANTHONY

Der Einfluß von
**Sauerstoffatmung auf Erythrocytenzahl
und Haemoglobingehalt**
des menschlichen Blutes

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung des Doktorgrades
der Hohen Medizinischen Fakultät

der

JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT
FRANKFURT A. M.

Vorgelegt von
CORNELIA RAAB
aus Offenbach a. M.



Meinen lieben Eltern
gewidmet!

Sauerstoffatmung wird in der Klinik bereits seit längerer Zeit zu verschiedenen Zwecken angewandt. Sie hat sich vor allem bei Störungen der Lungenlüftung bewährt, die zu einer ungenügenden Sauerstoffsättigung des arteriellen Blutes geführt haben. (Hypoxämie) Erfahrungsgemäß ist sie aber auch dann von Nutzen, wenn die Sauerstoffspannung im Gewebe durch Störung des Sauerstofftransportes vermindert ist, (z. B. bei Kreislaufkranken). Auch zu anderen Zwecken wird Sauerstoffatmung vielfach benutzt, z. B. beim Höhenflug zur Verhütung der Höhenkrankheit, bei verschiedenen Atemgeräten, bei Narkosen, zur Behandlung von Hautemphysem, bei der Stoffwechseluntersuchung mit den sog. geschlossenen Systemen usw.

Um die Wirkung der Sauerstoffatmung auf den Körper beurteilen zu können, muß klargestellt sein, wie sich die Sauerstoffatmung auf Atmung, Kreislauf und Blut auswirkt.

Die folgenden Untersuchungen sollen sich mit der Einwirkung der Sauerstoffatmung auf Haemoglobin und Erythrocyten beschränken.

Bei Betrachtung der Wirkung der Sauerstoffatmung auf Erythrocytenzahl und Haemoglobingehalt kommt erst dadurch ein abgerundetes Bild zustande, daß die Untersuchungsergebnisse über das Verhalten von Erythrocytenzahl und Haemoglobingehalt bei Sauerstoffmangelatmung und Sauerstoffatmung nebeneinander betrachtet und in Vergleich gesetzt werden.

Unter physiologischen Verhältnissen tritt Sauerstoffmangel bei Aufenthalt in höheren Luftschichten auf. Der Wechsel kann einmal sehr rasch erfolgen (Fliegen, Fahrt mit der Seilbahn), d. h. innerhalb weniger Minuten zum anderen aber auch langsamer (Bergbesteigung). Der Sauerstoffmangel kann dabei kurzdauernd oder lange Zeit anhaltend sein. Bei Sauerstoffmangel hat sich unter physiologischen Verhältnissen eine Vermehrung der Erythrocytenzahl, sowie eine Erhöhung des Haemoglobingehaltes feststellen lassen.

Diese Tatsache wurde zum ersten Male von *Viault* 1890 bei einem Aufenthalt in den peruanischen Anden in 4400 m Höhe aufgezeigt, wobei *Viault* zunächst nur die Erythrocytenzahl berücksichtigte. Ähnliche Ergebnisse erhielt auch Major *Hingston* bei den Eingeborenen des Pamir Plateaus in einer Höhe von 5550 m.

Seither wurden zahlreiche Untersuchungen in gleicher Richtung, und zwar unter Berücksichtigung auch des Haemoglobingehaltes, sowohl unter physiologischem, wie künstlich herbeigeführtem Sauerstoffmangel durchgeführt.

Auch schon kurzfristiger einmaliger Sauerstoffmangel führt zu einem Anstieg der Erythrocytenzahl und des Haemoglobingehaltes (*Brühl* und *Hanisch*) einem Verhalten, das auch bei ständigem Höhengaufenthalt zu beobachten ist. — *Loewy* stellte darüber hinaus eine geringfügige Zunahme der Gesamtblutmenge fest. Die Zunahme der Erythrocyten erklärte *Knor* mit dem Auftreten von Mikrocyten, die nach seinen Untersuchungen bis zu 20 % der Erythrocytenzahl betragen. *Loewy* und *Müller* führen sie ebenfalls auf eine vermehrte Erythropoese im Knochenmark zurück. Bei Versuchstieren (Hunden), die in der Höhe gelebt hatten, fand sich zellreiches rotes Knochenmark, während die im Flachland verbliebenen Kontrolltiere zellarmes gelbes Knochenmark aufwiesen.

Derartige Veränderungen sind allerdings nur bei längerem Aufenthalt im Höhenklima zu erwarten.

Immerhin wurde von anderer Seite (*von Bunge, Abderhalden*) auch bei raschem Höhenwechsel eine schnell einsetzende Erhöhung der absoluten Werte für Haemoglobin, sowie der Erythrocytenzahl beschrieben.

Diese bei Tierversuchen mit Kaninchen und Mäusen gewonnenen Ergebnisse treffen auch für den Menschen zu. So konnte *Gaule* bei Ballonfahrern und *Schnell* bei Fliegern gleichsinnige Beobachtungen machen, wobei gleichzeitig die rasche Reversibilität des Vorganges nach Rückkehr auf den Erdboden festgelegt wurde.

Die rasche Anpassung läßt als Erklärungsursache eine Neubildung der Zellen durch das Knochenmark als äußerst unwahrscheinlich ansehen. (*Barcroft*.) Die von *Abderhalden* und von *Bunge* herangezogene Verschiebung von Blutplasma ins Gewebe, also eine relative Vermehrung der Erythrocytenzahl, wird auch von *Naegeli, Schnell, Herbst, Schubert, Wintrobe* u. a. angeführt. Für einen Flüssigkeitsaustritt vom Blut in das Gewebe spricht auch die Eindickung des Serums, die von *Elias, Kaunitz* und *Laub* im Tierexperiment nachgewiesen wurde.

Neben dieser Flüssigkeitsverschiebung als sog. „Notmaßnahme“ (*Barcroft*) wurden bei plötzlichen Umstellungen auch andere Faktoren für die Veränderung im roten Blutbild aufgezeigt. So nehmen *Barcroft* und *Bürker* an, daß aus den Blutspeichern, vor allem der Milz, Erythrocyten in den Kreislauf abgegeben werden. Damit wäre also eine Zunahme der absoluten Erythrocytenzahl zu erwarten, falls nicht andererseits Erythrocyten gleichzeitig aus dem Kreislauf in andere Organe abwandern.

Für eine Flüssigkeitsverschiebung vom Blut in das Gewebe spricht auch die von *Forbes, Colleb* und *Fermont-Smith* nachgewiesene Ödembildung im Zentralnervensystem nach CO-Vergiftung, wobei allerdings nicht ganz klar ist, ob nicht auch eine Kapillarwandschädigung durch CO ursächlich in Frage kommt.

Die bei längerem Aufenthalt in sauerstoffarmem Milieu als „endgültige Maßnahme“ (*Barcroft*) bezeichneten Regulationen, bestehen nach *Naegeli* in einer Neubildung von Erythrocyten. Dafür spricht auch der von *Brühl* und *Hanisch* angegebene Anstieg der Retikulocyten.

Aus den Untersuchungen über die Wirkung des Sauerstoffmangels auf Haemoglobin und Erythrocyten ergibt sich folgendes:

„Sauerstoffmangel führt auch bei kurzdauernder Einwirkung schon zu einer Zunahme des Haemoglobins und der Erythrocyten. Dadurch wird der Sauerstofftransport im Blut verbessert und die Wirkung des Sauerstoffmangels zum Teil ausgeglichen“!

Ausgehend von Ergebnissen, wie sie bei Sauerstoffmangel gefunden wurden, ergibt sich die Frage, ob Sauerstoffzufuhr bei gesunden Menschen eine gegenteilige Wirkung zur Folge hat, d. h. einen Abfall der Erythrocytenzahl, Verminderung des Haemoglobingehaltes, Einströmen von Gewebsflüssigkeit in die Blutbahn und damit eine Zunahme der Gesamtblutmenge.

Zunächst wäre zu entscheiden, ob eine Sauerstoffatmung, sei es unter Atmosphärendruck, sei es unter erhöhtem Druck, ohne nachteilige Wirkung auf den menschlichen Organismus ist. Diese Frage erscheint um so mehr berechtigt, als bei den zuerst an Tieren ausgeführten Versuchen mit Sauerstoffüberdruckatmung von 3–4 Atmosphären (*Bert, Haldane* und *Smith* später *Bornstein*) Krämpfe und schließlich der Tod eintraten.

Selbst bei Sauerstoffatmung unter Atmosphärendruck konnten *Loewy* und *Meyer* bei kleinen Tieren Zirkulationsstörungen, sowie Entzündungen der Schleimhäute beobachten, während bei größeren Tieren Zirkulations- und Atmungsstörungen eintraten, dagegen Entzündungen nicht zum Ausbruch kamen. (*David*) Bei länger anhaltender Einatmung von Sauerstoff unter Atmosphärendruck (und zwar bei einer Dauer von zwei Tagen) wurden krankhafte Veränderungen in der Lunge festgestellt, die vielfach zum Tode führten, zum mindesten aber Erkrankungen hervorriefen.

In Analogie zu diesen Ergebnissen kann erwartet werden, daß sich der Mensch gegenüber einer längeren Einwirkung von Sauerstoff widerstandsfähiger verhält. Es dürfte ihm unbedenklich eine über 8–10 Stunden anhaltende Sauerstoffatmung zugemutet werden können. (*Loewy* und *Meyer*.) (*Clamann* und *Becker-Freysering* beobachteten bei Selbstversuchen über drei Tage bei 90% Sauerstoff und Normaldruck Parästhesien an Fingern und Zehen, sowie bei einer Versuchsperson Lungenveränderungen.)

Die ersten und ausgedehnten Untersuchungen über das Verhalten von Erythrocytenzahl und Haemoglobingehalt unter Sauerstoffatmung bei Mensch und Tier wurden von *Izumiyama* angestellt. Bei Mensch und Tier ergab sich bei Sauerstoffüberdruckatmung von 20 Minuten Dauer eine gleich starke Verminderung der Erythrocytenzahl, sowie eine gleich starke Verminderung des Haemoglobingehaltes und bei den Atmungsversuchen mit Sauerstoff unter Atmosphärendruck bei Tieren eine besonders starke Abnahme der Erythrocyten um bis zu einer Mill./ccm und des Haemoglobins um bis zu 15%. *Full* und *Friedrich* kamen selbst bei Menschen mit verschiedenen Krankheiten bei Sauerstoffatmung unter Überdruck über kurze Zeit zu den gleichen Resultaten. Als Erklärungsursache wurde sowohl von *Izumiyama*, als auch von *Full* und *Friedrich* angenommen, daß eine Einströmung von Gewebsflüssigkeit in das Blut stattfindet, mithin lediglich eine relative Verminderung der Erythrocytenzahl und des Haemoglobingehaltes eintritt. Für diese Annahme sprechen verschiedene Versuchsergebnisse, in erster Linie die von *Hitzenberger* und *Molenaar* festgestellte Zunahme der zirkulierenden Blutmenge, und zwar von 4,81 auf 5,21, d. h. 8,1%, zum weiteren die von den gleichen Autoren beschriebene Verminderung des Serumeiweißgehaltes, (*Izumiyama*) schließlich auch die Volumenverminderung der Erythrocyten, die nach denselben Autoren 6% beträgt. Zu dem gleichen Ergebnis gelangten *Schmidt-Lange* und *Podlowsky*. — Die Verkleinerung der Erythrocytendurchmesser kann aus den kolloid-osmotischen Verschiebungen erklärt werden.

Eine Erythrocytenzerstörung als Ursache für die verminderte Erythrocytenzahl ist nicht anzunehmen, weil die Veränderungen sehr rasch nach Einsetzen der Sauerstoffatmung eintreten, zum weiteren aber auch rasch reversibel sind. Diese Reversibilität geht auch aus den Versuchen von *Hitzenberger* und *Molenaar* hervor, die nur eine fast unmerkliche Abnahme der Erythrocytenzahl und des Haemoglobingehaltes fanden, die nach *Anthony* zweifellos darauf zurückzuführen ist, daß die Kontrolluntersuchung den Untersuchungen des roten Blutbildes 24 Stunden vorausging. Die ausgeprägtesten Verschiebungen im roten Blutbild sind unter Sauerstoffatmung in Verbindung mit erhöhtem Atmosphärendruck nachzuweisen. (*Izumiyama*.)

Anthony kam in seinen Arbeiten 1938 und 1939 zu den gleichen Resultaten, stellte außerdem aber fest, daß nicht nur bei Absetzen, sondern

auch bei Fortführen der Sauerstoffatmung die Veränderungen im roten Blutbild eine rasche Reversibilität aufweisen. *Anthony* verweist darüber hinaus auf die Tatsache, daß sich die Verminderung der Erythrocytenzahl und des Haemoglobingehaltes nicht gleichsinnig verhält, und zwar, daß die Erythrocytenzahl eine deutlich stärkere Abnahme aufweist als der Haemoglobinwert. So z. B. fand sich bei einer Versuchsreihe (15 Minuten Sauerstoffatmung) eine Verminderung der Erythrocytenzahl im Mittelwert um 7,8 %, dagegen des Haemoglobingehaltes im Mittelwert um 3,3 %. — Gleichartige Verhältnisse ergeben sich schon aus den Versuchen von *Izumiya* ohne daß diesem allerdings die Unterschiedlichkeit aufgefallen zu sein scheint. (Es ist in diesem Zusammenhang von Interesse zu wissen, daß *Loew* bei seinen Versuchen mit Sauerstoffmangelatmung ebenfalls ein ungleichartiges Verhalten von Haemoglobin und Erythrocyten fand, nämlich einen stärkeren Anstieg des Haemoglobinwertes als der Erythrocytenzahl.) Der mittlere Haemoglobingehalt des einzelnen Erythrocyten zeigt eine geringe Zunahme. *Anthony* zieht daraus den Schluß, daß andersartige, und zwar haemoglobinreichere Erythrocyten in den Kreislauf gelangt sein müssen. Es bleibt dabei allerdings die Frage offen, woher diese Erythrocyten stammen.


Mit Rücksicht auf die grundsätzliche Bedeutung dieser Befunde habe ich die Angaben *Anthony*s nachgeprüft und Versuche mit Sauerstoffatmung bis zu zwei Stunden durchgeführt.

Versuchsanordnung: Die Untersuchungen wurden in der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr vormittags begonnen. Die Versuchspersonen waren noch nüchtern. Sie lagen auf einem Ruhebett in einem Untersuchungszimmer. Bei der Versuchsanordnung wurde Wert darauf gelegt, daß keine Beeinflussungen der Versuchspersonen durch Umweltreize stattfand, da diese, vor allem die Sinneswahrnehmungen akustischer Art, erfahrungsgemäß zu einer Beeinflussung der Atmungstiefe und -frequenz führen. Außer der Versuchsausrüstung, die im Rücken der Versuchsperson aufgestellt wurde, befanden sich keine Apparaturen im Untersuchungsraum. Auch wurden bei den Versuchen keine Personen außer dem Untersucher zugelassen. Es wurde außerdem Wert auf eine gleichmäßige Zimmertemperatur gelegt, (etwa 25°. Die Versuche wurden alle im Sommer ausgeführt.)

Nach 15 Minuten Ruhelage wurden zunächst die Erythrocyten- und Haemoglobinwerte ohne Einfluß der Sauerstoffatmung untersucht. Mit einer Rasierklinge wurde eine gut blutende Wunde erzeugt und die Blutentnahme erst einige Minuten nach erfolgter Läsion vorgenommen. Nach *Bürker* eignet sich zur Blutentnahme besonders der vierte Finger der linken Hand unter anderem auch deshalb, weil die durch die Manipulationen hervorgerufenen Änderungen des Kapillarblutes in der Fingerkuppe geringer als in anderen Körperstellen, wie z. B. dem Ohrläppchen sind. Der aus der Wunde quellende erste Blutstropfen wurde abgewischt, da hierin das spezifische Gewicht und somit die Erythrocytenzahl größer sein soll. (*Grawitz*.) Erst der zweite Blutstropfen wurde zum Versuch verwandt.

Zunächst wurde nach Aufsetzen der Atmungsmaske Außenluft geatmet, und, nach Erreichen gleichmäßiger Atmungsbewegungen und einer gleichmäßigen Atmungsfrequenz durch Drehung des Dreivegehahnes von der Versuchsperson unbemerkt die Verbindung mit dem Spirometer hergestellt, was auf der anderen Seite mit der Sauerstoffbombe verbunden war (siehe

Abbildung!). Das zwischengeschaltete Spirometer erlaubt einmal eine genaue Registrierung der Atmungstiefe, sowie der Atmungsfrequenz und bewirkt daneben eine gewisse Feuchtigkeitsanreicherung des Sauerstoffs. Durch diese Versuchsanordnung wurden außerdem erhöhte Atemwiderstände vermieden.



Nach der Sauerstoffatmung wurde die zweite Blutprobe ohne erneuten Einschnitt entnommen und erst dann die Atmung abgesetzt.

Die Bestimmung des Haemoglobins erfolgte nach der von *Bürker* angegebenen Methode unter Benutzung des Kompensationskolorimeters.


Das Haemoglobin wurde mit Natriumhydrosulfit reduziert, da dieses schon in kleinsten Mengen und somit ohne wesentliche Änderung der Konzentration des Farbstoffes wirksam ist. Der mittlere Fehler ist nach dieser Bestimmung viel geringer als nach der von Sahli und anderen angegebenen Methode und beträgt $\pm 1\%$.

Auch die Erythrocytenzahl wurde nach der Methode von *Bürker* bestimmt, die gegenüber der von Thoma-Zeiß wesentliche Vorzüge aufweist. So wird vor allem eine ungleiche Verteilung der Erythrocyten auf der Zählfläche vermieden. Von großem Vorteil ist auch, daß zwei getrennte Zählräume mit weitmaschigen Zählnetzen vorhanden sind. Auch die mit einer Reihe von Fehlern behaftete Mischpipette ist durch verschiedenartige Pipetten für die getrennte Entnahme von Blut und Verdünnungsflüssigkeit ersetzt, die Mischung geschieht also erst in einem Rundkölbchen. Das mit dieser Methode erzielte Zählresultat ist mit einem mittleren Fehler von

$\pm 2,3\%$ behaftet, der ebenfalls weit unter dem der anderen Methoden liegt. — Es wurden je 3×80 Quadrate bei 43 Untersuchungen ausgezählt.

Für jeden Versuch wurde eine andere gesunde Versuchsperson gewählt, nur die Versuche von 5 und 10 Minuten Sauerstoffatmung wurden jeweils an den gleichen Versuchspersonen durchgeführt, d. h. nach 5 Minuten Sauerstoffatmung wurde die zweite Blutprobe entnommen, ohne die Sauerstoffatmung abzusetzen. Nach 10 Minuten Sauerstoffatmung erfolgte die letzte Entnahme. —

Alle Versuchspersonen reagieren annähernd ähnlich:



Befunde: Aus den beigegeführten graphischen Darstellungen der Untersuchungsergebnisse ergibt sich folgendes:

Nach Einsetzen der Sauerstoffatmung tritt ein zunächst rascher Abfall von Erythrocytenzahl und Haemoglobingehalt auf. Der Tiefpunkt wird nach 15 Minuten erreicht, der Abfall der Erythrocytenzahl ist erheblich größer als der des Haemoglobingehaltes, und zwar ist das prozentuale Verhältniß 6,3/3,9. In der Zeitspanne zwischen 15 und 30 Minuten liegt die Umkehr des Kurvenverlaufes. Der Anfangswert wird sowohl für Haemoglobingehalt, wie Erythrocytenzahl etwa bei 52 Minuten erreicht. Danach setzt ein Anstieg der Kurve über den Anfangswert hinaus ein, wobei der Anstieg nach 60 Minuten für die Erythrocyten 1,1 %, für das Haemoglobin 0,7 % über den Anfangswert beträgt. Aus der weiteren Fortführung des Versuchs geht hervor, daß nach 120 Minuten der Ausgangspunkt erreicht, bezw. sogar leicht unterschritten ist. Die gefundenen Werte decken sich mit den von *Anthony* 1938 und 1939 aufgefundenen. — Der erste Scheitelpunkt ist aus der gegebenen Versuchsreihe nicht genau zu ermitteln. Er liegt nach *Anthony* bei 20 Minuten nach Versuchsbeginn, was auch nach dem hier aufgezeichneten Kurvenverlauf wahrscheinlich sein dürfte. Der erste Schnittpunkt der Kurve mit der Abszisse, d. h. die Erreichung des Anfangswertes liegt etwa bei 50 Minuten, wobei sich dieses Resultat ebenfalls mit der *Anthony's* deckt. Danach erfolgt, was bisher in keiner Untersuchungsreihe berücksichtigt worden war, (die Versuchsreihen von *Anthony* erstrecken sich maximal über 50 Minuten) ein Anstieg der Kurve über die Abszisse, wobei nach 60 Minuten der zweite Gipfel der Kurve erreicht ist. Allerdings liegt hierbei die Höhe des Anstiegs wie die Senkung der Kurvenendwerte unter die Anfangswerte innerhalb der durch die Versuchsmethoden bedingten Fehlergrenze. Es muß aber immerhin die Möglichkeit offen gelassen werden, daß in der Versuchsdauer zwischen 60 und 120 Minuten der Erythrocyten-, bzw. Haemoglobinanstieg noch über den 60 Minutenwert hinausgehen kann.

Es sei schließlich noch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sich bei der anfänglichen Abnahme von Erythrocytenzahl und Haemoglobinwerten eine Abweichung dahingehend ergab, daß die Erythrocytenzahl erheblich stärker vermindert wurde als es dem Abstieg des Haemoglobinwertes entsprach. Daraus ergibt sich eine Änderung des Haemoglobinwertes, bezogen auf die Erythrocytenzahl (sog. HbE-Wert). Dieser wurde auf Grund der Mittelwerte berechnet. Während der Sauerstoffatmung zeigt der durchschnittliche Haemoglobingehalt eines Erythrocyten eine geringe Zunahme, mit Ausnahme der 60 Minutenatmung, bei der eine Abnahme von 0,3 % gefunden wurde (siehe Kurven!).

Besprechung: Die erhaltenen Ergebnisse bestätigen, daß Sauerstoffatmung zu einer Verminderung der Erythrocyten und des Haemoglobins führen. Diese Verminderung ist aber nur vorübergehend, so daß nach einer Stunde die Ausgangswerte erreicht sind. Es tritt sogar eine geringe Überhöhung der Ausgangswerte ein.

Eine Erklärung für das Übersteigen der Anfangswerte soll hier noch nicht gegeben werden, man muß jedoch an eine überschüssige Reaktion unbekannter Art denken, ein Verhalten, wie es von vielen Reaktivmaßnahmen des Organismus — hier sei z. B. an das Verhalten des Blutzuckerspiegels beim Staub-Traubeschen Versuch erinnert — bekannt ist. Da der Anstieg über die Anfangswerte innerhalb der Fehlergrenze der Untersuchungsmethode liegt, es aber auch möglich ist, daß sich hierin eine gewisse Gesetzmäßigkeit ausdrückt, kann eine absolut stichhaltige Hypothese dieser Art noch nicht aufgestellt werden.

Wie *Izumiya* zeigte, ist die Veränderung der Erythrocyten- und Haemoglobinwerte zu einem Teil auf Blutverdünnung zurückzuführen. Dem entsprechend fanden *Hitzenberger* und *Molenaar* auch eine Zunahme der Blutmenge.

Ob die nach 20 Minuten einsetzende Zunahme der Erythrocyten und des Haemoglobins ebenfalls auf Veränderung des Blutwassergehaltes zurückzuführen ist, kann auf Grund dieser Befunde nicht entschieden werden. Die Untersuchungen der Eiweißwerte werden weitere Klärung bringen.

Wahrscheinlich ist die Zunahme der Erythrocyten- und Haemoglobinwerte in erster Linie auf andere Ursachen zurückzuführen. In diesem Zusammenhang ist das Verhalten des HbE-Wertes von besonderem Interesse.

Anthony stellte in seinen Versuchen mit kurzdauernder Sauerstoffatmung 1938 und 1939 eine Zunahme der HbE-Werte fest. Diese Tatsache wird auch durch die vorliegende Arbeit bestätigt. *Anthony* erklärte sie dam

daß entweder haemoglobinreichere Erythrocyten in die Blutbahn gelangen oder haemoglobinarmer Erythrocyten die Blutbahn verlassen. — Auf jeden Fall zeigt die Veränderung des HbE-Wertes, daß die Blutbefunde bei Sauerstoffatmung durch eine Zunahme des Blutwassergehaltes nicht vollständig erklärt werden können, sondern daß außerdem eine Änderung in der Erythrocytenzusammensetzung eingetreten sein muß.

Zusammenfassung.

1. Die Wirkung von Sauerstoffatmung auf Erythrocyten, Haemoglobin und HbE-Wert wird an 43 Versuchspersonen untersucht.
2. Sauerstoffatmung führt zu einer vorübergehenden Abnahme der Erythrocyten und des Haemoglobins. Der niedrigste Wert wird nach etwa 15—20 Minuten gefunden. Nach einer Stunde sind die Ausgangswerte wieder erreicht. Das Haemoglobin wird um maximal 3,9 % die Erythrocyten um 6,3 % vermindert.
3. Die HbE-Menge nimmt bei Sauerstoffatmung vorübergehend zu und zwar um maximal 2,5 %.
4. Die Veränderungen der Erythrocyten und des Haemoglobins sind in erster Linie wahrscheinlich durch Erhöhung des Blutwassergehaltes erklärt. Die Veränderung des HbE-Wertes weist jedoch darauf hin, daß außerdem wahrscheinlich haemoglobinreiche Erythrocyten in die Blutbahn einströmen.

Literaturverzeichnis.

- Anthony, A. I.:*
und Biedenkopf: „Funktionsprüfung der Atmung“. 1937.
 „Der Einfluß kurzdauernder Sauerstoffatmung auf Haemoglobingehalt und Erythrocytenzahl des menschlichen Blutes“. I. Mittlg. (Zeitschr. f. exp. Med. 1938, 103. s. a. Kongr. Z. Bl. Innere 1938, 96. B., S. 478).
- Anthony, A. I.:*
und Bedthold: „Der Einfluß kurzdauernder Sauerstoffatmung auf Haemoglobingehalt und Erythrocytenzahl des menschlichen Blutes“. II. Mittlg. (Zeitschr. f. exp. Med. 1939, 105. s. a. Kongr. Z. Bl. Innere 1939, 101. B., S. 30).
 „Der Durchmesser menschlicher Erythrocyten bei Sauerstoffatmung“. (Zeitschr. f. exp. Med. 1939, 105. Bl., S. 423—429, s. a. Kongr. Z. Bl. Innere 1939, 101. B., S. 29).
- Anthony, A. I.:*
 „Sauerstoff und Kreislauf“. (Luff. Med. 1939, S. 4, 11—13, s. a. Kongr. Z. Bl. Innere 1939, 103. B., S. 289.)
 „Über Sauerstoffatmung“. (Dsch. med. Wochenschr. 1940, I., S. 482, 484, s. a. Kongr. Z. Bl. Innere 1941, 106. B., S. 670.)
- Arch. Krlf.-Forsch.:* 2., 1938, S. 192—209:
 „Tierversuche über Sauerstoffmangel und Erstickung“
 s. a. Kongr. Z. Bl. Innere 1938, 95. B., S. 545.)
- Barcroft, I.:* „Die Atmungsfunktion des Blutes“. I., 1927.
- Binet, Leon, Bochet:* „Über sauerstoffreiche Luftgemische“.
 (J. Physiol. et de Path. Gen. 37. B., 1939, S. 524—535
 s. a. Kongr. Z. Bl. Innere, 1940, 107. B., S. 331.
 „Überangebot von Sauerstoff und Erythrocytenverminderung“
 (Sang 14. B., 1941, S. 433—440, s. a. Kongr. Z. Bl. Innere, 1942, 110. B., S. 511.)
- Büchner, F.:* „Die pathologische Wirkung des Sauerstoffmangels, insbesondere bei der Höhenkrankheit und dem Höhentod“.
 (Klin. Wochenschr. 1942.)
- Bürker, K.:* „Die physiologische Wirkung auf das Blut“.
 (Zeitschr. f. Biologie 1913, 61. B., S. 379.)
 „Genauere Haemoglobinbestimmung und Erythrocytenzählung“.
 (Handbuch der biolog. Arbeitsmeth., Abtg. 4. T. 4, 1927.)

- v. Brühl, W. und Hanisch, K.:* „Das Verhalten des menschlichen Blutbildes bei wiederholtem kurzdauerndem Sauerstoffmangel“.
(Klin. Wochenschr. 1942.)
- Clamann, H. G., Becker-Freysering:* „Einwirkung von Sauerstoff auf den Organismus bei höherem als normalem Partialdruck unter besonderer Berücksichtigung des Menschen“.
(Lufft. Med. 4, 1939, S. 1—10, s. a. Kongr. Z. Bl. Innere 1940, 10. B., S. 241.)
- Fitzgerald, Mason, O. M., Ferzar, F.:* „Änderung der Erythrocytenzahl im Hochgebirge“.
(Kongr. Z. Bl. Innere, 1940, 105. B., S. 454.)
- Full und Friedrich:* „Wirkung von Sauerstoffüberdruckatmung auf die Blutzusammensetzung“.
(Klin. Wochenschr. 1923, S. 69)
- Hitzenberger, A. und Mollenaar, H.:* „Der Einfluß von Sauerstoffatmung auf das Blut normale Menschen“.
(Klin. Wochenschr. 1934, II., S. 1599)
- Hamburger:* „Observation on the effects of oxygen therapy“.
(J. amer. med. assoc. 1932, Mai 21, s. a. Zentr. Bl. für Innere Med. 1933, S. 199)
- Hingston, R. W. G.:* „Die phys. Schwierigkeiten bei der Besteigung des Mount Everest“.
(„Die Atmungsfunktion des Blutes“ I., 1927 Barcroft.)
- Horneffer, L.:* „Das Blut des Menschen mit neueren Methoden untersucht“.
(Archiv f. Phys. 1928, 220. B., S. 703.)
- Humperdunk, K.:* „Zur Frage colorimetrischer Bestimmung des Haemoglobins als reduziertes Hb oder als salzsaures Haematin“.
(Dsch. Arch. klin. Med. 1939, 108. B., S. 379—386.)
- Krajewski, Franciszek:* „Die Wirkung der verdünnten Luft während der Sauerstoffatmung auf die Zahl der Erythrocyten, sowie auf den Haemoglobingehalt des menschlichen Blutes“.
(Bull. internat. Akad. pol. Sci. Cl. Med. 1939, Nr. 9/10, Seite 737—745) (s. a. Kgr. Z. Bl. f. Bl. Inn. 1940, 107. B. S. 331.)
- Kroetz, Ch.:* „Die Sauerstoffbindungskurve des menschlichen Blutes“.
(Zentr. Bl. f. Innere Med. 1935, S. 739.)
- Knipping, H. W.:* „Über die Sauerstofftherapie bei Herz- und Lungenkranken“.
(Zeitschr. Klin. Med. 124., H. 5/6, s. a. Zentr. Bl. f. Innere Med. 1934, S. 216.)
- Zimmermann, G.:*
- Loewy, A. und Meyer:* „Untersuchungen über Respiration und Zirkulation“. 1895.
„Über künstliche Atmung mit und ohne hochprozentigen Sauerstoff“. (Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Militärsanitätswesens. 1918—25, S. 73—78.)

- Marx, H.:* „Der Wasserhaushalt des gesunden und kranken Menschen“. 1935
„Haemoglobinschwankungen und Wasserhaushalt“. (Klinische
Wochenschr. 1927, S. 947.)
- Matthes, R.:* „Über Einfluß von Sauerstoffmangel auf den peripheren Kreis-
lauf“. (Verh. d. dsch. Ges.-Kreislaufforschung 1941, S. 109—112)
(s. a. Kongr. Z. Bl. Innere 1942, 110 B., S. 621)
- Meyer, P.:* „Die Bedeutung der Haemoglobinvermehrung bei Sauerstoff-
mangel“. (Zeitschr. Klin. Med. 120., H. 3/4, s. a. Zentr. Bl. Innere
Med. 1933, S. 620.)
- Naegeli, O.:* „Blutkrankheiten und Blutdiagnostik“. 1919.
- Nolli, B.:* „Die Bestimmung der zirkulierenden Blutmenge und ihre Be-
deutung für die wirklich vorhandene Menge der Er. u. d. Hb.“
(Riforma med. 49. B., Nr. 42, s. a. Zentr. Bl. f. Innere Med. 1934,
S. 635.)
- Proc. roy. Soc. Med.:* 30., 1937, S. 995—1006: „Respiration in high flying“.
- Schmoll, G.:* „Das Blut des Menschen mit verschiedenen Methoden unter-
sucht“. (Pflüger's Archiv für Phys. 1931, 227., S. 160.)
- Seifarth, C.:* „Über die Blutveränderung bei Luftdruckerniedrigung“. (Höhen-
klima.) (Klin. Wochenschr. 6. Jahrg., Nr. 11, s. a. Zentr. Bl. für
Innere Med. 1927, S. 1196.)
- Sonne, C.:* „Die theoretische Begründung der Sauerstoffinhalationstherapie“.
(Schweiz. med. Wochenschr. 1940, II., S. 1208—1219, s. a. Kongr.
Z. Bl. Innere 1941, S. 471, B. 107.)
- Sorensen:* „Über Schwankungen im Haemoglobingehalt des Kapillar-
blutes“. (Nord. Med. Stockh. 1941, S. 1117—22, s. a. Kongr. Z.
Bl. Innere 1942, 109. B., S. 703.)
- Strughold:* „Sauerstoffatmung und Höhenluft“.
(Kongr. Z. Bl. Innere 108. B., S. 425.)
- Uhlenhuth:* „Das Versagen des rechten Herzens (Prognose und Therapie“).
(Zentr. Bl. für Innere Med. 1932, S. 970.)
- Walterhöfer, G.:* „Untersuchungen über Haemoglobin und Erythrocytenschwan-
kungen“. (Klin. Wochenschr. 1927, S. 350, s. a. Zentr. Bl. für
Innere Med. 1927, S. 703.)

Zum Schlusse meiner Arbeit möchte ich Herrn Professor *Anthony* und Herrn Oberarzt *Bröder* für die gütigen Anleitungen bei der Ausführung der Versuchsreihen bestens danken. Besonderen Dank Herrn Professor *Anthony* für die freundliche Überlassung des Themas!

Anhang.

Erythrocyt. in 10^6

Hb in gr %

1. Versuchsreihe:

Vp.	v. O_2 At.	n. 5 Min. O_2 At.	Vp.	v. O_2 At.	n. 5 Min. O_2 At.
1	4,30	4,19	1	13,73	13,32
2	4,60	4,39	2	14,18	14,00
3	5,04	4,91	3	14,79	14,41
4	4,30	4,13	4	13,70	13,46
5	4,26	4,03	5	12,72	12,37
M. W.	4,50	4,33	M. W.	13,82	13,51
3,8 %			2,2 %		

2. Versuchsreihe:

Vp.	v. O_2 At.	n. 10 Min O_2 At.	Vp.	v. O_2 At.	n. 10 Min. O_2 At.
1	4,30	4,09	1	13,73	13,27
2	4,60	4,34	2	14,18	13,77
3	5,04	4,76	3	14,79	14,26
4	4,30	4,03	4	13,70	13,22
5	4,26	3,96	5	12,72	12,16
M. W.	4,50	4,24	M. W.	13,82	13,34
5,8 %			3,4 %		

3. Versuchsreihe:

Erythroc. in 10 ⁶			Hb in gr %		
Vp.	v. O ₂ At.	n. 15 Min. O ₂ At.	Vp.	v. O ₂ At.	n. 15 Min. O ₂ A
1	5,26	4,86	1	16,00	15,50
2	4,65	4,28	2	13,71	12,58
3	4,68	4,38	3	13,74	12,75
4	4,32	3,99	4	13,74	12,95
5	4,69	4,43	5	14,86	14,13
6	4,38	4,15	6	14,11	13,93
7	4,25	4,02	7	13,78	13,41
8	4,48	4,21	8	13,89	13,51
9	4,67	4,51	9	13,76	13,56
10	4,94	4,63	10	15,04	14,51
11	4,26	3,88	11	13,71	13,31
M. W.			M. W.		
	4,59	4,30		14,21	13,65
	6,3 %			3,9 %	

4. Versuchsreihe:

Vp.	v. O ₂ At.	n. 30 Min. O ₂ At.	Vp.	v. O ₂ At.	n. 30 Min. O ₂ A
1	4,25	4,08	1	14,19	13,78
2	4,53	4,44	2	14,75	14,12
3	4,97	4,81	3	13,61	13,45
4	4,19	4,03	4	12,85	12,60
5	5,03	4,80	5	15,53	15,25
6	4,92	4,79	6	14,36	14,20
7	5,07	4,84	7	14,66	14,33
8	5,04	4,73	8	13,89	13,52
9	5,22	5,15	9	14,38	14,26
10	4,67	4,51	10	14,08	13,78
M. W.			M. W.		
	4,79	4,62		14,23	13,93
	3,5 %			2,1 %	

5. Versuchsreihe:

Erythrocyt. in 10 ⁶			Hb in gr %		
Vp.	v. O ₂ At.	n. 60 Min. O ₂ At.	Vp.	v. O ₂ At.	n. 60 Min. O ₂ At.
1	4,54	4,57	1	14,10	14,00
2	4,84	4,94	2	14,89	15,28
3	4,97	5,02	3	13,94	14,26
4	4,88	4,93	4	14,43	14,32
5	4,62	4,66	5	14,15	14,23
6	4,35	4,40	6	13,66	13,73
M. W.	4,70	4,75	M. W.	14,20	14,30
1,1 % Z.			0,7 % Z.		

6. Versuchsreihe:

Vp.	v. O ₂ At.	n. 120 Min. O ₂ At.	Vp.	v. O ₂ At.	n. 120 Min. O ₂ At.
1	4,76	4,76	1	14,96	14,93
2	4,06	4,02	2	12,46	12,44
3	4,34	4,36	3	13,29	13,37
4	5,00	4,97	4	15,79	15,83
5	5,29	5,32	5	15,15	15,12
6	4,72	4,71	6	15,35	15,25
M. W.	4,70	4,69	M. W.	14,50	14,49
0,2 % Abn.			0,1 % Abn.		

$Hb_E = \text{Wert in } 10^{-12} \text{ g}$

Versuchsdauer	Hb_E in 10^{-12} g	%
5 Min.: 1. v. O_2	30,71	1,6 Zun.
2. n. O_2	31,20	
10 Min.: 1. v. O_2	30,71	2,4 Zun.
2. n. O_2	31,46	
15 Min.: 1. v. O_2	30,96	2,5 Zun.
2. n. O_2	31,74	
30 Min.: 1. v. O_2	29,71	1,5 Zun.
2. n. O_2	30,15	
60 Min.: 1. v. O_2	30,21	0,3 Abn.
2. n. O_2	30,11	
120 Min.: 1. v. O_2	30,85	0,2 Zun.
2. n. O_2	30,90	

Prozentzahlen der Einzelwerte:

5 Min.		10 Min.		60 Min.	
Hb.	Er.	Hb.	Er.	Hb.	Er.
3,0% ○	2,6% ○	3,4% ○	4,9% ○	0,7% ○	0,7% ○
1,3 „ △	4,6 „ △	4,2 „ △	5,7 „ △	2,6 „ △	2,1 „ △
2,6 „ □	2,6 „ □	3,6 „ □	5,6 „ □	2,3 „ □	1,0 „ □
1,7 „ ◇	4,0 „ ◇	3,5 „ ◇	6,3 „ ◇	0,8 „ ◇	1,0 „ ◇
2,8 „ ×	5,4 „ ×	4,4 „ ×	7,0 „ ×	0,6 „ ×	0,9 „ ×
				0,5 „ +	1,1 „ +
15 Min.		30 Min.		120 Min.	
Hb.	Er.	Hb.	Er.	Hb.	Er.
3,1% ○	7,6% ○	2,9% ○	4,0% ○	0,2% ○	0,0% ○
8,2 „ △	8,0 „ △	4,3 „ △	2,0 „ △	0,2 „ △	1,0 „ △
7,3 „ □	6,4 „ □	1,2 „ □	3,2 „ □	0,6 „ □	0,5 „ □
5,7 „ ◇	7,6 „ ◇	1,9 „ ◇	3,8 „ ◇	0,3 „ ◇	0,6 „ ◇
4,9 „ ×	5,5 „ ×	1,8 „ ×	4,6 „ ×	0,2 „ ×	0,6 „ ×
1,3 „ +	5,3 „ +	1,1 „ +	2,6 „ +	0,7 „ +	0,2 „ +
2,7 „ ●	5,4 „ ●	2,2 „ ●	4,6 „ ●		
2,7 „ ▲	6,0 „ ▲	2,7 „ ▲	6,2 „ ▲		
1,5 „ ■	3,4 „ ■	0,8 „ ■	1,3 „ ■		
3,1 „ ◆	6,3 „ ◆	5,0 „ ◆	3,4 „ ◆		
2,9 „ ▢	8,9 „ ▢				

Lebenslauf.

Als Tochter des Lehrers Johann Raab und seiner Ehefrau Katharina, geb. Herrmann, wurde ich am 8. Januar 1922 in Offenbach a. M. geboren. Nachdem ich nach dreijährigem Besuch der Grundschule $3\frac{1}{2}$ Jahre der Mittelschulklasse meines Vaters angehört hatte, trat ich im Herbst 1934 in die Untertertia der Studienanstalt Offenbach a. M. ein, wo ich Ostern 1939 die Reifeprüfung bestand. Dann widmete ich mich dem Studium der Medizin an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt a. M. Ostern 1941 bestand ich mein Physikum, im März 1945 das medizinische Staatsexamen.

gez.: Cornelia Raab.

G. Ph. Schaefer G. m. b. H., Offenbach am Main

46/32x4